

HU-FRIEDY PEDO & PERMANENT CROWNS

STAINLESS STEEL PRIMARY AND PERMANENT MOLAR CROWNS

Instructions for Use

Hu-Friedy's Stainless Steel Crowns are intended to provide full coverage, stronger, provisional treatment for primary molars and fill the need for long term provisional coverage on permanent molars. To help minimize contouring and trimming, these stainless steel primary and permanent molar crowns are precrimped, prebelled and prefestooned.

Crown Selection and Preparation

- Select the proper crown size. Measure the mesiodistal dimension of the tooth in the patient's mouth. Next, measure the crowns in the kit to determine the corresponding size.
- Once the appropriate size has been identified, test for accurate fit in the mouth. Note the occlusal relationship between the opposing teeth and the relationship to the adjacent dentition.
- Using an explorer, probe for any open margins between the preparation and the crown. If necessary, reshape the crown to achieve a better marginal fit.
- If there is excessive blanching of the gingival tissue when the crown is seated, the crown will need to be trimmed. Using an indelible pen or wax pencil, mark the crown following the contour of the gingiva. Use crown scissors to trim 1 mm below the mark. Try to cut in a smooth motion to avoid producing sharp metal burs that might irritate the patient's tissue. If sharp areas are produced, use a heatless stone to remove the burs and polish with a rubber wheel. Use contouring pliers to reshape and crimp the crown at the trimmed margins. Complete another test fit to ensure accuracy, proper contacts and occlusion.
- Complete another try-in fit to ensure accuracy, proper contact and check the occlusion.
- When checking the occlusion, carefully notice any differences in the maxillary/mandibular relationship. If the crown is fully seated and the crown prevents proper occlusion, further reduction of the preparation may be necessary. Slightly reduce the tooth further and re-try the crown once again to confirm proper occlusion.

Seating the Crown

- Isolate the prepared tooth by placing rubber dam or by using cotton rolls.
- Wash and thoroughly dry the preparation.
- Mix the cement and fill the selected crown, following cement manufacturer's instructions.

CORONAS PEDIÁTRICAS Y PERMANENTES HU-FRIEDY

CORONAS MOLARES PERMANENTES Y PRIMARIAS DE ACERO INOXIDABLE

Instrucciones de uso

Las coronas de acero inoxidable Hu-Friedy están diseñadas para brindar un tratamiento provisorio más resistente con cobertura completa para molares primarios y responden a la necesidad de una cobertura provisional a largo plazo para molares permanentes. Para ayudar a minimizar el moldeado y los recortes, estas coronas molares primarias y permanentes de acero inoxidable vienen preengarzadas, preacampanadas y prefestoneadas.

Selección y preparación de la corona

- Seleccionar el tamaño correcto de corona. Tomar la medida mesiodistal del diente en la boca del paciente. Luego, medir las coronas del juego para determinar el tamaño correspondiente.
- Una vez identificado el tamaño correcto, probar el ajuste preciso en la boca. Prestar atención a la relación oclusal entre el diente opuesto y la relación con la dentición adyacente.
- Con un explorador, examinar si hay márgenes abiertos entre la preparación y la corona. Si es necesario, remodelar la corona para conseguir un mejor ajuste de los márgenes.
- Si hay blanqueo excesivo del tejido gingival cuando se asienta la corona, esta debe recortarse. Con un bolígrafo indeleble o un lápiz de cera, marcar la corona siguiendo el contorno de la encía. Usar tijeras para corona para recortar 1 mm por debajo de la marca. Tratar de hacer un corte lento y suave para evitar producir rebabas metálicas filosas que pueden irritar el tejido del paciente. Si se producen áreas filosas, usar una piedra que no genere calor para quitar las rebabas y pulir con una rueda de goma. Usar la pinzas de moldeado para remodelar y engarzar la corona en los márgenes recortados. Realizar otro ajuste de prueba para garantizar la precisión, los contactos adecuados y la oclusión.
- Realizar otro ajuste de prueba para garantizar la precisión, los contactos adecuados y controlar la oclusión.
- Cuando se controle la oclusión, revisar cuidadosamente si hay diferencias en la relación maxilar/mandibular. Si la corona está completamente asentada y evita la oclusión adecuada, podría ser necesario reducir aún más la preparación. Reducir ligeramente el diente un poco más y volver a probar la corona para confirmar la oclusión adecuada.

Asentar la corona

- Aislamiento del diente preparado colocando un dique de goma o usando rollos de algodón.
- Lavar y secar completamente la preparación.
- Mezclar el cemento y llenar la corona seleccionada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cemento.

HU-FRIEDY PEDO- UND PERMANENTE KRONEN

EDELSTAHLKRONEN FÜR MILCH- UND BLEIBENDE MOLAREN

Gebrauchsweisung

Hu-Friedy Edelstahlkronen sind für eine umfassende Abdeckung sowie eine stärkere, provisorische Behandlung von Milchmolaren bestimmt und erfüllen die Anforderungen für eine langfristige provisorische Abdeckung von bleibenden Molaren. Diese Edelstahlkronen für Milch- und bleibende Molaren sind vorgefertigt, vorgeformt und haben einen abgerundeten Zervikalrand, wodurch der Konturierungs- und Anpassungsaufwand minimiert wird.

Auswahl und Präparation der Krone

- Die geeignete Kronengröße auswählen. Die mesiodistale Abmessung des Zahns im Mund des Patienten messen. Anschließend die Kronen im Kit messen, um die geeignete Größe zu bestimmen.
- Nachdem die geeignete Größe identifiziert wurde, auf präzisen Sitz im Mund prüfen. Die okklusale Beziehung zwischen den gegenüberliegenden Zähnen und die Beziehung zu den angrenzenden Zähnen prüfen.
- Mit einer Sonde sorgfältig auf offene Ränder zwischen der Präparation und der Krone untersuchen. Falls erforderlich, die Form der Krone anpassen, um einen besseren gingivalen Sitz zu erreichen.
- Falls das Gingalgewebe nach dem Setzen der Krone übermäßig blass wird, muss die Krone angepasst werden. Die Krone mit einem wasserfesten Stift oder Wachsstift entlang der Kontur der Gingiva markieren. 1 mm unterhalb der Markierung mit einer Kronenschere abschneiden. Den Schnitt mit einer möglichst gleichmäßigen Bewegung ausführen, um scharfe Metallgrade zu vermeiden, die das Gewebe des Patienten reizen können. Falls scharfe Kanten entstehen, die Kanten mit einem Heatless-Stein entfernen und mit einem Gummi-Polierrad abschleifen. Die Krone am angepassten Kronenrand mit einer Konturierzange neu formen und crimpeln. In einem weiteren Test den präzisen Sitz, den ordnungsgemäßen Kontakt und die korrekte Okklusion sicherstellen.
- Die Krone erneut testweise einsetzen, um den präzisen Sitz und den richtigen Kontakt sicherzustellen sowie die Okklusion zu überprüfen.
- Bei der erneuten Überprüfung der Okklusion genau auf mögliche Abweichungen in der Ober-/Unterkieferbeziehung achten. Wenn die vollständig eingesetzte Krone die korrekte Okklusion verhindert, ist möglicherweise eine weitere Reduktion der Präparation erforderlich. Den Zahn noch ein wenig mehr reduzieren und die korrekte Okklusion der Krone erneut überprüfen.

Einsetzen der Krone

- Den präparierten Zahn durch Platzieren von Kofferdam oder Verwendung von Watterollen isolieren.
- Die Präparation waschen und sorgfältig trocknen.
- Den Zement mischen und die gewählte Krone unter Befolgeung der Anweisungen des Zementherstellers füllen.

- Seat the crown. Recommendation: for mandibular crowns start at the lingual surface, pressing across to the buccal surface; for maxillary crowns start at the buccal surface, pressing across to the lingual. This will assist in the residual cement being squeezed out. Do not use excessive force during final seating.

- During the initial seating of the crown, verify proper alignment by checking the relationship with adjacent teeth and opposing teeth. When proper alignment is confirmed, instruct the patient to bite on gauze or an occlusal bite stick; this will ensure the crown is fully seated into the proper occlusion. If using a device to assist in crown seating during cementation, please use care to obtain proper occlusion. Do not use excessive force in order to avoid seating the crown below the level of proper occlusion.
- Following individual cement manufacturer's instructions, remove the excess cement at the allocated time. Cement removal can be done with an explorer, scaler, or excavator. Use dental floss to remove cement from the interproximal surfaces and subgingival areas.

Hu-Friedy Stainless Steel Crowns are made with a stainless steel alloy that contains elemental nickel and chromium. A small percentage of the population is known to be allergic to these metals. If an allergic reaction occurs, direct the patient to consult a physician.

This product is intended for use only by dental professionals.

This product is single use (disposable); reuse is prohibited. Potential risks if the product was reused include:

- Introduction of microbes into the body due to reuse of item which may have been contaminated during its first use, which can result in subsequent health deterioration of patient
- Soft tissue injury from any rough edges if the crown was previously trimmed

Keep product at room temperature and out of direct sunlight.

To reorder **Hu-Friedy Pedo and Permanent Crowns**, call 1-800-Hu-Friedy.

Distributed by:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC: 3232 N. Rockwell St.
Chicago, IL 60618 | USA

Telephone: 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Website: Hu-Friedy.com

MADE IN KOREA

- Asentar la corona. Recomendación: para las coronas mandibulares, comenzar en la superficie lingual, poniendo hasta la superficie bucal; para las coronas maxilares, comenzar en la superficie bucal, poniendo hasta la lingual. Esto ayudará a que el cemento residual salga por compresión. No aplicar fuerza excesiva durante el asentamiento final.

- Durante el asentamiento inicial de la corona, verificar la alineación adecuada controlando la relación entre los dientes adyacentes y los dientes opuestos. Cuando se confirme la alineación adecuada, pedir al paciente que muerda una gasa o un palillo para morder; esto garantizará que la corona esté completamente asentada en la oclusión adecuada. Si se usa un dispositivo para ayudar a asentar la corona durante la cementación, tener cuidado al tratar de lograr la oclusión adecuada. No aplicar fuerza excesiva para evitar que la corona se asiente por debajo del nivel de la oclusión adecuada.
- Siguendo las instrucciones del fabricante del cemento, quitar el exceso de cemento en el momento determinado. El cemento se puede quitar con un explorador, raspador o excavador. Usar hilo dental para quitar el cemento de las superficies interproximales y áreas subgingivales.

Las coronas de acero inoxidable Hu-Friedy están fabricadas con una aleación de acero inoxidable que contiene níquel y cromo. Se sabe que un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. Si ocurre una reacción alérgica, indicar al paciente que consulte un médico.

Este producto está destinado solo a profesionales de la odontología.

Este producto se puede utilizar solo una vez (descartable); se prohíbe su reutilización. Los riesgos potenciales de la reutilización del producto incluyen:

- Introducción de microbios en el cuerpo debido a la reutilización del producto que podría haberse contaminado durante el primer uso, lo que puede causar el deterioro de salud posterior del paciente

- Lesión del tejido blando provocada por los bordes irregulares si la corona se recortó previamente

Mantener el producto a temperatura ambiente y lejos de la luz del sol directa.

Para volver a pedir **coronas pediátricas y permanentes Hu-Friedy**, llame al 1-800-Hu-Friedy.

Fabricado por:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC: 3232 N. Rockwell St.

Chicago, IL 60618 | EE. UU.

Telephone: 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Website: Hu-Friedy.com

HECHO EN COREA

- Die Krone einsetzen. Empfehlung: Bei Unterkieferkronen an der lingualen Oberfläche beginnen und zur bukkalen Oberfläche hin drücken. Bei Oberkieferkronen an der bukkalen Oberfläche beginnen und zur lingualen Oberfläche hin drücken. Auf diese Weise wird der überschüssige Zement verdrängt. Beim endgültigen Einsetzen keine übermäßige Kraft anwenden.
- Während des ersten Einsetzens der Krone die richtige Ausrichtung durch Prüfen der Beziehung zu den angrenzenden Zähnen und den gegenüberliegenden Zähnen sicherstellen. Wenn die richtige Ausrichtung erzielt wurde, den Patienten anweisen, auf einen Aufbisstupfer oder einen Okklusal-Aufbisstupfer zu beißen. Damit wird sichergestellt, dass die Krone vollständig in der korrekten Okklusion sitzt. Wenn beim Einsetzen der Krone während der Zementierung ein Instrument verwendet wird, vorsichtig vorgehen, um die korrekte Okklusion zu erzielen. Keine übermäßige Kraft anwenden, um den Sitz der Krone unterhalb der korrekten Okklusionsebene zu vermeiden.
- Den überschüssigen Zement unter Befolgeung der Anweisungen des Zementherstellers zum entsprechend vorgegebenen Zeitpunkt entfernen. Die Entfernung des Zements kann mit einer Sonde, einem Scaler oder einem Exkavator vorgenommen werden. Den Zement mit Zahnteile von den interproximalen Oberflächen und subgingivalen Bereichen entfernen.

Hu-Friedy Edelstahlkronen sind aus einer Edelstahllegierung mit elementarem Nickel und Chrom hergestellt. Ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist gegen diese Metalle allergisch. Falls eine allergische Reaktion auftritt, den Patienten an einen Arzt überweisen.

Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt (Einwegprodukt). Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung birgt möglicherweise u. a. folgende Risiken:

- Einführung von Mikroben in den Körper durch die Wiederverwendung des Produkts, das bei seiner ersten Verwendung kontaminiert worden sein kann. Dies kann zu einer nachfolgenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten führen.

- Verletzung von Weichgewebe durch mögliche scharfe Kanten, falls die Krone zuvor zugeschnitten wurde.

Produkt bei Raumtemperatur und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Nachbestellungen von **Hu-Friedy Pedo- und permanenten Kronen** unter: +1-800-Hu-Friedy.

Fabrikado por:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC: 3232 N. Rockwell St.

Chicago, IL 60618 | USA

Telephone: 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Website: Hu-Friedy.com

HEGESTELLT IN KOREA



1-800-Hu-Friedy

Hu-Friedy.com

N3382/0820



1639



N3382/0820

EC REP

CE Medical
Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands

Shinhung Co., LTD.

Headquarter Office: 450 Cheongpa-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea

Factory: 42-25, Dongsan-ro 27beon-gil, Danwon-gu
Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

- Die Krone einsetzen. Empfehlung: Bei Unterkieferkronen an der lingualen Oberfläche beginnen und zur bukkalen Oberfläche hin drücken. Bei Oberkieferkronen an der bukkalen Oberfläche beginnen und zur lingualen Oberfläche hin drücken. Auf diese Weise wird der überschüssige Zement verdrängt. Beim endgültigen Einsetzen keine übermäßige Kraft anwenden.
- Während des ersten Einsetzens der Krone die richtige Ausrichtung durch Prüfen der Beziehung zu den angrenzenden Zähnen und den gegenüberliegenden Zähnen sicherstellen. Wenn die richtige Ausrichtung erzielt wurde, den Patienten anweisen, auf einen Aufbisstupfer oder einen Okklusal-Aufbisstupfer zu beißen. Damit wird sichergestellt, dass die Krone vollständig in der korrekten Okklusion sitzt. Wenn beim Einsetzen der Krone während der Zementierung ein Instrument verwendet wird, vorsichtig vorgehen, um die korrekte Okklusion zu erzielen. Keine übermäßige Kraft anwenden, um den Sitz der Krone unterhalb der korrekten Okklusionsebene zu vermeiden.
- Den überschüssigen Zement unter Befolgeung der Anweisungen des Zementherstellers zum entsprechend vorgegebenen Zeitpunkt entfernen. Die Entfernung des Zements kann mit einer Sonde, einem Scaler oder einem Exkavator vorgenommen werden. Den Zement mit Zahnteile von den interproximalen Oberflächen und subgingivalen Bereichen entfernen.

Hu-Friedy Edelstahlkronen sind aus einer Edelstahllegierung mit elementarem Nickel und Chrom hergestellt. Ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist gegen diese Metalle allergisch. Falls eine allergische Reaktion auftritt, den Patienten an einen Arzt überweisen.

Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt (Einwegprodukt). Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung birgt möglicherweise u. a. folgende Risiken:

- Einführung von Mikroben in den Körper durch die Wiederverwendung des Produkts, das bei seiner ersten Verwendung kontaminiert worden sein kann. Dies kann zu einer nachfolgenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten führen.

- Verletzung von Weichgewebe durch mögliche scharfe Kanten, falls die Krone zuvor zugeschnitten wurde.

Produkt bei Raumtemperatur und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Nachbestellungen von **Hu-Friedy Pedo- und permanenten Kronen** unter: +1-800-Hu-Friedy.

Vertrieb durch:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC: 3232 N. Rockwell St.

Chicago, IL 60618 | USA

Telephone: 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Website: Hu-Friedy.com

HERGESTELLT IN KOREA

EC REP


CE Medical
Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, The Netherlands

Shinhung Co., LTD.

Headquarter Office: 450 Cheongpa-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea

Factory: 42-25, Dongsan-ro 27beon-gil, Danwon-gu
Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

- Die Krone einsetzen. Empfehlung: Bei Unterkieferkronen an der lingualen Oberfläche beginnen und zur bukkalen Oberfläche hin drücken. Bei Oberkieferkronen an der bukkalen Oberfläche beginnen und zur lingualen Oberfläche hin drücken. Auf diese Weise wird der überschüssige Zement verdrängt. Beim endgültigen Einsetzen keine übermäßige Kraft anwenden.
- Während des ersten Einsetzens der Krone die richtige Ausrichtung durch Prüfen der Beziehung zu den angrenzenden



COURONNES PÉDIATRIQUES ET PERMANENTES HU-FRIEDY

COURONNES EN ACIER INOXYDABLE POUR MOLAIRES DE LAIT ET DÉFINITIVES

Mode d'emploi

Les couronnes en acier inoxydable de Hu-Friedy sont conçues pour assurer une couverture complète, pour permettre un traitement temporaire plus solide pour les molaires de lait et pour répondre au besoin d'une couverture temporaire à long terme sur les molaires définitives. Pour minimiser le cintrage et le façonnage, ces couronnes en acier inoxydable pour molaires de lait et définitives sont pré-serties, pré-cintrées et pré-adaptées à la dentition du patient.

Selection et préparation des couronnes

1. Sélectionnez une couronne de taille adaptée. Mesurez la dimension mesio-distale de la dent dans la bouche du patient. Mesurez ensuite les couronnes dans le kit afin de déterminer la taille correspondante.
2. Une fois la taille adéquate identifiée, vérifiez son ajustement précis dans la bouche. Vérifiez l'occlusion dentaire et la position des dents adjacentes.
3. À l'aide d'une sonde, examinez les éventuelles zones ajourées entre la préparation et la couronne. Si nécessaire, remodelez la couronne pour obtenir un meilleur ajustement.
4. En cas de blanchiment gingival excessif lorsque la couronne est en place, cette dernière devra être refaçonnée. À l'aide d'un stylo indélébile ou d'un crayon à cire, marquez la couronne en suivant le contour de la gencive. À l'aide de ciseaux pour couronne, découpez en observant une marge de 1 mm en dessous du tracé. Essayez de découper délicatement pour éviter de produire des bavures métalliques coupantes susceptibles d'irriter les tissus du patient. Si des zones coupantes apparaissent, ébavurez à l'aide d'une fraise à faible échauffement et polissez avec une roulette en caoutchouc. Avec une pince à cintre, remodelez et sertissez la couronne en l'adaptant aux bords découpés. Effectuez un autre essai pour garantir la précision, l'occlusion et un bon contact.
5. Effectuez un autre essai pour garantir la précision, l'occlusion et un bon contact.
6. Lors de la vérification de l'occlusion, faites particulièrement attention aux écarts au niveau de la relation maxillo/mandibulaire. Si la couronne est complètement insérée et que cette dernière empêche une occlusion adéquate, il peut être nécessaire de procéder à une réduction supplémentaire. Réduisez légèrement la dent et réessayez à nouveau la couronne pour vérifier que l'occlusion est correcte.

Mise en place de la couronne

1. Isolez la dent préparée en plaçant une digue dentaire en caoutchouc ou à l'aide de tampons de coton.
2. Lavez et séchez soigneusement la préparation.

3. Mélangez le ciment et remplissez la couronne sélectionnée en suivant les instructions du fabricant du ciment.

4. Mettez la couronne en place. Recommandation : pour les couronnes mandibulaires, commencez au niveau de la surface linguale, en appuyant sur la surface buccale ; pour les couronnes maxillaires, commencez au niveau de la surface buccale, en appuyant à travers la surface linguale. Cela aidera à extraire le ciment résiduel. N'exercez pas de force excessive lors de la mise en place finale.

5. Lors de la mise en place initiale de la couronne, vérifiez que l'alignement avec les dents adjacentes et les dents opposées est correct. Une fois l'alignement correct confirmé, demandez au patient de mordre sur une compresse de gaze ou une tige de contrôle de mordu occlusal. Vous pourrez ainsi vous assurer que la couronne est complètement insérée et que l'occlusion est correcte. En cas d'utilisation d'un dispositif destiné à faciliter la mise en place de la couronne pendant le scellement, procédez avec soin de façon à obtenir une occlusion adéquate. N'exercez pas de force excessive afin d'éviter d'insérer la couronne en dessous du niveau d'occlusion correct.

6. En suivant les instructions du fabricant du ciment, retirez l'excès de ciment au moment opportun. Le retrait du ciment peut être effectué à l'aide d'une sonde, d'un détartreur ou d'un excavateur. Utilisez le fil dentaire pour retirer le ciment des surfaces inter-proximales et des zones sous-gingivales.

Les couronnes en acier inoxydables de Hu-Friedy sont constituées d'un alliage d'acier inoxydable contenant du nickel et du chrome élémentaires. Un faible pourcentage de la population est allergique à ces métaux. En cas de réaction allergique, indiquez au patient de consulter un médecin.

Ce produit est destiné à l'usage exclusif des professionnels dentaires.

Ce produit est à usage unique (jetable). Sa réutilisation est interdite. En cas de réutilisation, les risques potentiels sont les suivants :

- Introduction de microbes dans le corps en raison de la réutilisation d'un objet ayant pu être contaminé lors de sa première utilisation, ce qui peut entraîner une détérioration ultérieure de la santé du patient
- Lésion des tissus mous due à des arêtes rugueuses si la couronne a déjà été taillée

Conservez le produit à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pour renouveler une commande de **couronnes pédiatriques et permanentes Hu-Friedy**, composez le 1-800-Hu-Friedy.

Distribué par :

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC : 3232 N. Rockwell St.
Chicago, IL 60618 | États-Unis
Téléphone : 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Site Web: Hu-Friedy.com

FABRIQUÉ EN CORÉE

COROAS PEDIÁTRICAS E PERMANENTES HU-FRIEDY

COROAS MOLARES PRIMÁRIAS E PERMANENTES EM AÇO INOXIDÁVEL

Instruções de Utilização

As coroas de aço inoxidável Hu-Friedy foram projetadas para fornecer cobertura completa, mais forte, tratamento provisório para molares primários e preencher a necessidade de cobertura provisória a longo prazo em molares permanentes. Para ajudar a minimizar a moldagem do contorno e a necessidade de aparar, estas coroas para molares primários e permanentes de aço inoxidável são previamente comprimidas, pré-moldadas em forma de sino e pré-festonadas.

Seleção e Preparação da Coroa

1. Selecionar o tamanho apropriado da coroa. Medir a dimensão mesiodistal do dente na boca do paciente. Em seguida, medir as coroas contidas no kit para determinar o tamanho correspondente.
2. Depois de identificado o tamanho apropriado, testar quanto ao ajuste exato na boca. Considerar a relação da condição oclusal com os dentes opostos e a relação com a dentição adjacente.
3. Usando um explorador, examinar se existem margens evidentes entre o dente preparado e a coroa. Se necessário, voltar a moldar a coroa para obter um melhor ajuste marginal.
4. Caso o tecido gengival apresente um branqueamento excessivo quando a coroa estiver assente em posição, esta necessitará de ser aparada. Usando uma caneta indelével ou um marcador seco, marcar a coroa seguindo o contorno da gengiva. Com uma tesoura para coroas, aparar 1 mm abaixo da marca. Tentar cortar usando um movimento suave para evitar produzir cristas metálicas cortantes que possam irritar o tecido do paciente. Se forem produzidas áreas cortantes, usar um disco abrasivo para remover as cristas e polir com uma ponta de borracha. Usar um alicate de contorno para moldar de novo e comprimir a coroa nas margens apuradas. Realizar outro teste de adaptação para garantir a precisão, contactos apropriados e oclusão.
5. Efetuar outro teste de adaptação para garantir a precisão, contacto apropriado e verificar a oclusão.
6. Ao verificar a oclusão, observar cuidadosamente quaisquer diferenças presentes na relação maxilar/mandibular. Se a coroa estiver completamente assente e impedir uma oclusão apropriada, poderá ser necessário reduzir ainda mais o dente preparado. Reduzir um pouco mais o dente e tentar de novo a adaptação da coroa para confirmar uma oclusão apropriada.

Assentamento da Coroa

1. Isolar o dente preparado, colocando-o num dique de borracha ou usando rolos de algodão.
2. Lavar e secar minuciosamente o dente preparado.

3. Misturar o cimento e preencher a coroa selecionada, seguindo as instruções do fabricante do cimento.

4. Posicionar a coroa. Recomendação: com as coroas mandibulares iniciar a nível da superfície lingual, premendo fino alla superficie buccale. Al contrario, per le corone maxilarie partire dalla superficie buccale esercitando pressione fino a quella linguale. Si avverrà così la fuoriuscita del cemento rimanente. Durante il posizionamento finale non forzare in maniera eccessiva.

5. Nel corso del posizionamento iniziale della corona, verificare il corretto allineamento controllando la relazione con i denti adiacenti e con quelli antagonisti. Dopo aver confermato il corretto allineamento, far mordere al paziente una garza o uno stecchetto per morso oclusale; si potrà così essere sicuri del completo posizionamento della corona nella giusta occlusione. Se durante la cementazione si utilizza uno strumento per favorire il posizionamento della corona, prestare attenzione a ottenere la corretta occlusione. Non esercitare una forza eccessiva per evitare che la corona si posizioni al di sotto del livello dell'occlusione corretta.

6. Attenendosi alle istruzioni fornite dai singoli produttori del cimento, rimuovere il cimento in eccesso al momento stabilito. Il cemento può essere tolto con una sonda, un raschietto o un escavatore. Usare il filo interdentale per eliminare il cemento dalle superfici interproximali e dalle zone sottogingivali.

As Coroas de Aço Inoxidável da Hu-Friedy são produzidas com uma liga de aço inoxidável contendo níquel e cromo elementares. É de conhecimento geral que uma pequena percentagem da população é alérgica a estes metais. Se ocorrer uma reação alérgica, informar o paciente que deve consultar um médico.

Este produto destina-se a ser utilizado apenas por profissionais especializados na área de odontologia.

Este produto foi concebido para uma única utilização (descartável); a sua reutilização é proibida. Os potenciais riscos associados à reutilização do produto incluem:

- Introdução de microrganismos no organismo devido à reutilização do produto, que pode ter sido contaminado durante a sua primeira utilização, o que pode resultar na subsequente deterioração da saúde do paciente.

- Lesões nos tecidos moles devido a arestas vivas se a coroa tiver sido previamente aparada.

Manter o produto à temperatura ambiente e afastado da luz solar direta.

Para efetuar nova encomenda de **Coroas Pediátricas e Permanentes Hu-Friedy**, contactar através do número 1-800-Hu-Friedy.

Distribuído por:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC : 3232 N. Rockwell St.
Chicago, IL 60618 | EUA
Teléfono : 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Site Web: Hu-Friedy.com

PRODUTO IN COREIA

1-800-Hu-Friedy

Hu-Friedy.com

N3382/0820

CORONE PEDIATRICHE E PERMANENTI HU-FRIEDY

CORONE MOLARI PRIMARIE E PERMANENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Istruzioni per l'uso

Le corone in acciaio inossidabile di Hu-Friedy sono destinate a fornire una copertura completa, un trattamento più forte e provvisorio per i molari primari e a soddisfare la necessità di una copertura provvisoria a lungo termine sui molari permanenti. Per contribuire a minimizzare la modellazione del contorno e la necessità di aprire, queste corone per molari primari e permanenti in acciaio inossidabile sono prerinfinte, precombinate in forma di campana e pre-festonate.

Selezione e preparazione della corona

1. Scegliere la corona della grandezza corretta. Misurare la dimensione mesio-distale del dente nel cavo orale del paziente. Successivamente, valutare le corone contenute nel kit per stabilire la grandezza corrispondente.
2. Una volta determinata la misura appropriata, valutare il preciso posizionamento in bocca. Fare attenzione alla relazione oclusale tra i denti antagonisti e il rapporto rispetto alla dentizione adiacente.
3. Con una sonda, verificare l'eventuale presenza di margini aperti tra la preparazione e la corona. Se necessario, rimodellare la corona per ottenere un miglior adattamento marginale.
4. Se si osserva un'eccessiva sclerotizzazione del tessuto gengivale con la corona in posizione, la corona dovrà essere rifatta. Usando un pennarello indelebile o un marcador secco, marcare la corona seguendo il contorno della gengiva. Con una tesoura per corone, tagliare 1 mm sotto la marca. Tentare di tagliare usando un movimento lento per evitare di produrre sbavature metalliche taglienti che potrebbero irritare i tessuti del paziente. Se vengono prodotti aree taglienti, usare un disco abrasivo per rimuovere le sbavature e lucidare con un disco di gomma. Usando le pinze per contornare, rimodellare e ridurre la corona a livello dei margini rifinati. Eseguire un'altra verifica dell'adattamento per controllare il livello di accuratezza, che i contatti siano corretti e l'occlusione.
5. Eseguire un'altra prova dell'adattamento per confermare l'accuracy, che il contatto sia corretto e controllare l'occlusione.
6. Per controllare l'occlusione, individuare attentamente eventuali differenze nella relazione maxillare-mandibolare. Se la corona è inserita completamente e impedisce una occlusione appropriata, dovrà essere necessario ridurre ulteriormente il dente preparato. Ridurre un po' di più il dente e provare di nuovo l'adattamento della corona per confermare una occlusione appropriata.

Assentamento da corona

1. Isolare il dente preparato, collocando-o in un dique di gomma o utilizzando rotoli di cotone.
2. Lavare e asciugare accuratamente il dente preparato.

3. Mescolare il cemento e riempire la corona prescelta seguendo le istruzioni del produttore del cemento.

4. Posizionare la corona. Raccomandazione: con le corone mandibolari iniziare a livello della superficie linguale, premendo fino alla superficie buccale. Al contrario, per le corone maxillari partire dalla superficie buccale esercitando pressione fino a quella linguale. Si avverrà così la fuoriuscita del cemento rimanente. Durante il posizionamento finale non forzare in maniera eccessiva.

5. Nel corso del posizionamento iniziale della corona, verificare il corretto allineamento controllando la relazione con i denti adiacenti e con quelli antagonisti. Dopo aver confermato il corretto allineamento, far mordere al paziente una garza o uno stecchetto per morso oclusale; si potrà così essere sicuri del completo posizionamento della corona nella giusta occlusione. Se durante la cementazione si utilizza uno strumento per favorire il posizionamento della corona, prestare attenzione a ottenere la corretta occlusione. Non esercitare una forza eccessiva per evitare che la corona si posizioni al di sotto del livello dell'occlusione corretta.

6. Seguendo le istruzioni fornite dai singoli produttori del cemento, rimuovere il cemento in eccesso al momento stabilito. Il cemento può essere tolto con una sonda, un raschietto o un escavatore. Usare il filo interdentale per eliminare il cemento dalle superfici interproximali e dalle zone sottogingivali.

Le corone in acciaio inossidabile Hu-Friedy sono prodotte in una lega di acciaio inossidabile che contiene nichel e cromo elementari. È noto che una ridotta percentuale della popolazione è allergica a questi metalli. Se occorre una reazione allergica, invitare il paziente a consultare un medico.

Questo prodotto è destinato all'uso unicamente da parte di professionisti del settore odontoiatrico.

Questo prodotto fu concepito per una unica utilizzazione (descartável); la sua reutilizzazione è proibita. I potenziali rischi associati alla reutilizzazione del prodotto includono:

- L'introduzione di microrganismi nell'organismo per via del riutilizzo di un articolo che può essere stato contaminato durante la sua prima utilizzazione, o che può comportare un successivo aggravamento dello stato di salute del paziente.

- Lesioni ai tessuti molli, dovute a eventuali margini ruvidi ove la corona sia stata in precedenza rifinita.

Conservare il prodotto a temperatura ambiente e a riparo dalla luce solare diretta.

Per ordinare nuove corone pediatriche e permanenti Hu-Friedy, chiamare il numero 1-800-Hu-Friedy.

Distribuito da:

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC : 3232 N. Rockwell St.
Chicago, IL 60618 | USA

Teléfono : 1-800-Hu-Friedy (1-773-975-6100)

Site Web: Hu-Friedy.com

PRODOTTO IN COREA

CORONE PEDIATRICHE E PERMANENTI HU-FRIEDY

CORONE MOLARI PRIMARIE E PERMANENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Istruzioni per l'uso

Le corone in acciaio inossidabile di Hu-Friedy sono destinate a fornire una copertura completa, un trattamento più forte e provvisorio per i molari primari e a soddisfare la necessità di una copertura provvisoria a lungo termine sui molari permanenti. Per contribuire a minimizzare la modellazione del contorno e la necessità di aprire, queste corone per molari primari e permanenti in acciaio inossidabile sono prerinfinte, precombinate in forma di campana e pre-festonate.

Selezione e preparazione della corona

1. Scegliere la corona della grandezza corretta. Misurare la dimensione mesio-distale del dente nel cavo orale del paziente. Successivamente, valutare le corone contenute nel kit per stabilire la grandezza corrispondente.
2. Una volta determinata la misura appropriata, valutare il preciso posizionamento in bocca. Fare attenzione alla relazione oclusale tra i denti antagonisti e il rapporto rispetto alla dentizione adiacente.
3. Con una sonda, verificare l'eventuale presenza di margini aperti tra la preparazione e la corona. Se necessario, rimodellare la corona per ottenere un miglior adattamento marginale.
4. Se si osserva un'eccessiva sclerotizzazione del tessuto gengivale con la corona in posizione, la corona dovrà essere rifatta. Usando un pennarello indelebile o un marcador secco, marcare la corona seguendo il contorno della gengiva. Con una tesoura per corone, tagliare 1 mm sotto la marca. Tentare di tagliare usando un movimento lento per evitare di produrre sbavature metalliche taglienti che potrebbero irritare i tessuti del paziente. Se vengono prodotti aree taglienti, usare un disco abrasivo per rimuovere le sbavature e lucidare con un disco di gomma. Usando le pinze per contornare, rimodellare e ridurre la corona a livello dei margini rifinati. Eseguire un'altra verifica dell'adattamento per controllare il livello di accuratezza, che i contatti siano corretti e l'occlusione.
5. Eseguire un'altra prova dell'adattamento per confermare l'accuracy, che il contatto sia corretto e controllare l'occlusione.
6. Per controllare l'occlusione, individuare attentamente eventuali differenze nella relazione maxillare-mandibolare. Se la corona è inserita completamente e impedisce una occlusione appropriata, dovrà essere necessario ridurre ulteriormente il dente preparato. Ridurre un po' di più il dente e provare di nuovo l'adattamento della corona per confermare una occlusione appropriata.

Assentamento da corona

1. Isolare il dente preparato, collocando-o in un dique di gomma o utilizzando rotoli di cotone.
2. Lavare e asciugare accuratamente il dente preparato.

3. Mescolare il cemento e riempire la corona prescelta seguendo le istruzioni del produttore del cemento.

4. Posizionare la corona. Raccomandazione: con le corone mandibolari iniziare a livello della superficie linguale, premendo fino alla superficie buccale. Al contrario, per