



Porcelain Primer

en Instructions for use
es Instrucciones de uso
ro Instrucțiuni de utilizare

de Gebrauchsleitung
it Istruzioni per l'uso
sv Bruksanvisning

fr Mode d'emploi
ru Инструкция по применению
el Οδηγίες χρήσης

nl Gebruiksaanwijzing
pl Instrukcja obsługi
pt Instruções de uso

04.0.2020-09
72445

Manufacturer
SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

EC REP
SHOFU DENTAL GmbH
An der Pott 70, 40885 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684



READ CAREFULLY BEFORE USE

Primer for bonding porcelain or composite

PRODUCT DESCRIPTION
SHOFU Porcelain Primer is a priming agent designed to treat the surfaces of porcelain or composite restorations to enhance bond with adhesive resin cement. SHOFU Porcelain Primer can be used intraorally and extraorally.

INDICATIONS FOR USE
Bonding porcelain or composite restorations with adhesive resin cement

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or methacrylate monomer.
- Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer must not use this product.
- If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
- Use in well ventilated areas to avoid inhalation of ethanol (several appropriate ventilations per hour are recommended). If inhalation causes nausea or illness, take rest and keep warm in fresh air.
- Avoid any source of ignition since this product is flammable.
- Use protective gloves and glasses to avoid sensitization to this product. In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball, and rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek medical advice.
- Follow the instructions for use of each material, instrument or equipment to be used in conjunction with this product.
- Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.
- Use this product within the expiration date indicated on the package or container.
(Example **YYYY-MM-DD** → Year-Month-Date of the expiration date)
- This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE

1. Pretreatment of the restoration surface

- Intraoral use
Roughen the adhesive surface of restoration using a dental abrasive (eg. diamond bur etc), rinse with water and dry with clean air. Additional etching treatment with Phosphoric acid etchant (concentration of 30-40%) enhances adhesive effect.
- Extraoral use
Sandblast the adhesive surface of restoration with 50-100 µm aluminum oxide at approx. 0.1-0.2 MPa/1-2 bar. Then, rinse with water and dry with clean air.

2. Application of SHOFU Porcelain Primer

Dispense adequate amount of SHOFU Porcelain Primer on a dish. Apply to the entire adhesive surface in one layer with a disposable brush. Leave it undisturbed for 10 sec. and dry naturally.

3. Sealing/Repairing of restorations

Follow adhesive resin cement manufacturer's instructions for use.

(Notes)

- Do not mix with any other primers or bonding systems.
- Tightly close the cap after each use as this product contains volatile components. Use all the dispensed material promptly.
- Use saliva ejector or suction during the procedure.
- Avoid contamination of the restoration surface to be bonded. If the surface is contaminated by saliva or blood, thoroughly clean the surface with an alcohol moistened cotton ball. Then, dry and reapply the material.
- Use all the dispensed material on only one patient.
- Do not reuse disposable brushes to avoid cross-contamination.

COMPOSITION

Ethanol, Silane coupling agent etc.

STORAGE

Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F). Keep away from direct sunlight and any source of ignition.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

Location of the symbols glossary: https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Primer für den Keramik- oder Komposithaftverbund

PRODUKTBESCHREIBUNG

SHOFU Porcelain Primer ist ein Haftvermittler zur Oberflächenbehandlung von Restaurierungen aus Keramik oder Komposit für einen festen Verbund mit adhäsiven Kompositzementen. SHOFU Porcelain Primer kann intra- und extraoral angewandt werden.

INDIKATIONEN

Haftvermittlung zwischen Restaurierungen aus Keramik oder Komposit und adhäsiven Kompositzementen

VORSICHTSMASNAHMEN UND WARINHINWEISE

- Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylatmonomere verwenden.
- Anwender mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylatmonomere dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Falls bei Patient oder Anwender Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
- Bei unbelüfteten Räumen verwenden, um ein Einatmen von Ethanol zu verhindern (es wird empfohlen, mehrmals pro Stunde gut zu lüften). Bei Übelkeit oder Unwohlsein nach verschiedenstem Einatmen an der frischen Luft ausruhen und dabei wärme halten.
- Das Produkt ist leicht entzündlich; von Zündquellen fernhalten.
- Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. Bei Augenkontakt die Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Bei allen zusammen mit dem Produkt verwendeten Materialien, Instrumenten oder Geräten die Gebrauchsanleitung beachten.
- Das Produkt ausschließlich für die in diesem Beipackzettel genannten Indikationen verwenden.
- Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behälter angegebenen Verfallsdatum benutzen.
(Beispiel **JJJJ-MM-TT** → Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)
- Das Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GE BRAUCHSANLEITUNG

1. Vorbehandlung der Restaurierungsfläche

- Intraorale Anwendung
Die Haftfläche der Restaurierung mit einem dentalen Schleifkörper (z.B. Diamantinstrument) anrauen, mit Wasser spülen und mit sauberer Luft trocknen. Durch zusätzliche Anätzten mit Phosphorsäure (Konzentration 30-40%) kann die Haftung weiter verbessert werden.
- Extraorale Anwendung
Die Haftfläche der Restaurierung mit Aluminiumoxid (50-100 µm) bei ca. 0,1-0,2 MPa/1-2 bar abstrahlen. Dann mit Wasser spülen und mit sauberer Luft trocknen.

2. Auftrag von SHOFU Porcelain Primer

Eine ausreichende Menge SHOFU Porcelain Primer in eine Schale geben. Mit einem Einmalpinsel in einer Schicht auf die gesamte Haftfläche auftragen. Dann 10 Sek. einwirken und von selbst trocknen lassen.

3. Einsetzen/Reparatur der Restaurierung

Die Gebrauchsanleitung für den verwendeten adhäsiven Kompositzement beachten.

(Hinweise)

- Das Produkt nicht mit anderen Primern oder Adhäsivsystemen mischen.
- Den Behälter nach jedem Gebrauch wieder fest verschließen, da das Produkt leicht flüchtige Bestandteile enthält. Das entnommene Material zugäng verbergen.
- Während der Behandlung Speichelabsauger oder Absauganlage verwenden.
- Verunreinigungen der Haftfläche der Restaurierung vermeiden. Bei Verunreinigung durch Speichel oder Blut mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch gründlich reinigen. Dann trocknen und das Material erneut auftragen.
- Das entnommene Material bei nur einem Patienten verwenden.
- Einmalpinsel nicht wieder verwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG

Ethanol, Silan-Haftvermittler u.a.

LAGERUNG

Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

fr

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

Primer pour les collages céramique ou composite

DESCRIPTION

SHOFU Porcelain Primer est un apprêt destiné au traitement de surface des restaurations céramiques ou composites afin de renforcer leur liaison avec les ciments résines. SHOFU Porcelain Primer s'utilise en intra et en extra-oral.

INDICATIONS

Liaison entre restaurations céramiques ou composites et les ciments résines

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser ce produit sur des patients allergiques à ce matériau et/ou au monomère acrylique.
- Même chose pour les opérateurs.
- En cas d'inflammation ou autre réaction allergique, interrompre immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.
- Le local doit être ventilé pour éviter de respirer de l'éthanol (plusieurs renouvellements de volume d'air par heure). En cas de nausée ou de malaise, sortir respirer l'air frais.
- Eviter toute source d'ignition car ce produit est inflammable
- Utiliser des lunettes et des gants de protection pour éviter la sensibilisation au produit. En cas de contact dermatique ou avec les tissus oraux, essuyer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer à grande eau. En cas de contact oculaire, rincer abondamment les yeux à l'eau et consulter un médecin.
- Suivre le mode d'emploi des fabricants de chaque matériau, instrument ou équipement en association avec ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le présent mode d'emploi.
- Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
(Exemple **AAAA-MM-JJ** → Année-Mois-Jour de la date d'expiration)
- L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

MODE D'EMPLOI

1. Prétraitement de surface

- En bouche
Dépolir la zone adhésive de la restauration à l'aide d'abrasifs (fraise diamant, etc.), rincer à l'eau et sécher à l'air comprimé. Un mordant supplémentaire à l'acide phosphrique (à 30-40%) pour effet de renforcer l'adhérence.
- En extra-oral
Sabrer la zone adhésive de la restauration à l'alumine 50-100 µm sous une pression d'environ 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Rincer à l'eau puis sécher à l'air comprimé exempt d'huile.

2. Application de l'apprêt SHOFU Porcelain Primer

Déposer la quantité nécessaire de SHOFU Porcelain Primer dans un godet. En appliquer une couche sur toute la zone adhésive à l'aide d'un pinceau jetable. Attendre 10 secondes et laisser sécher.

3. Scelllement/Réparation des restaurations

Suivre le mode d'emploi du fabricant de ciment résine.

(Notes)

- > Ne jamais mélanger ce primer avec un autre primer ou l'utiliser avec un autre système de collage.
- > Refermer soigneusement le flacon après chaque manipulation car il contient des composants volatils. Utiliser la quantité versée immédiatement.
- > Utiliser la pompe à salive ou une aspiration durant la procédure.
- > Eviter de contaminer la surface adhésive de la restauration. En cas de contamination salivaire ou sanguine, rincer à l'eau et nettoyer soigneusement à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. Sécher ensuite à l'air comprimé et réappliquer le primer.
- > Utiliser le produit versé rapidement et sur un seul patient.
- > Ne jamais réutiliser les pinceaux jetables pour éviter la contamination croisée.

COMPOSITION

Ethanol, agent silane etc.

STOCKAGE

Conserver à température ambiante (1-30 °C). Eviter la lumière solaire directe et toute source d'ignition.

nl

LEES ZORGVULDIG VOOR GEbruIK

Bindmiddel voor keramiek en composiet

PRODUCTOMSCHRIJVING

SHOFU Porcelain Primer is een bindmiddel voor de oppervlaktebehandeling van restauraties van keramiek of composiet en zorgt voor een zeer goede hechting aan adhesieve kompositcementen. SHOFU Porcelain Primer is geschikt voor intra- en extraorale gebruik.

INDICATIES VOOR HET GEbruIK

Hechting tussen restauraties van keramiek of composiet en adhesieve kompositcementen

VOORZORGSAAMTAARREGELLEN EN WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeren.
- Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeren mogen dit product niet gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik en raadpleg een arts in geval van een ontsteking of andere allergische reacties bij patiënt of gebruiker.
- Gebruik in goed geventileerde ruimten om inademing van ethanol te voorkomen (wij adviseren om een paar keer per uur goed te ventileren).
- Indien nadrukkelijk misselijkheid of een zeer gevoel veroorzaakt, zorg er dan voor dat het slachtoffer uitstroot in warm water gehouden in de frisse lucht.
- Dit product is ontvlambaar. Vermijd daarom elke ontstekingsbron.
- Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsschild om te voorkomen dat u overgevoelig wordt voor dit product. Als het product per ongeluk toch op uw gezicht of op de huid komt, verwijder het dan onmiddellijk met een alcohol gedrenkt watten of spoel met veel water. In geval van contact met de ogen dient u deze onmiddellijk te spoelen met veel water en een arts te raadplegen.
- Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van elk materiaal, instrument of apparaat dat u in combinatie met dit product gebruikt.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking of het flesje staat.
(bijvoorbeeld **JJJJ-MM-DD** → Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum)
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Voorbehandeling van het restauratieoppervlak

- Intra-orale gebruik
Ruwt het restauratieoppervlak op (bijv. met behulp van een boortje van diamant), spoel met water en droog met schone lucht. Een nog betere hechting is mogelijk, indien u ook éts met fosforzuur (concentratie 30-40%).
- Extra-orale gebruik
Zandstraal het hechtoppervlak van de restauratie met aluminiumoxide (50-100 µm) bij ca. 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Spoel vervolgens met water en droog met schone lucht.

2. Aanbrengen van SHOFU Porcelain Primer

Doe een dunne laag SHOFU Porcelain Primer op een schotelje. Breng met een wegwerpwapstokje één laag aan op het hele hechtoppervlak. Wacht 10 sec. en laat daarna op natuurlijke wijze drogen.

3. Plaatsen/reparen van restauraties

Houd u aan de gebruiksaanwijzing van het gebruikte adhesieve kompositcement.

(Let op)

- > Meng niet met andere bindmiddelen of bondings.
- > Sluit de dop goed na elk gebruik, aangezien dit product vluchte componenten bevat. Gebruik al het voorbereide materiaal snel.
- > Gebruik tijdens de behandeling een speekelszuiger of afzuiging.
- > Zorg ervoor dat het te hechten restauratie-oppervlak schoon blijft. Als er speekels of bloed op het oppervlak komen, maak het dan goed schoon met een in alcohol gedrenkt watten. Drog het oppervlak en breng het materiaal opnieuw aan.
- > Gebruik wegwerkstukjes niet opnieuw om kruisbesmetting te voorkomen.

SAMENSTELLING

Ethanol, silaanvliesoefstof etc.

OPSLAG

Bewaar op kamertemperatuur (1-30 °C). Stel niet bloot aan direct zonlicht of ontstekingsbronnen.

en

Instructions for use

fr

Gebrauchsleitung

es

Istruzioni per l'uso

ro

Instrucțiuni de utilizare

de

Brugsanvisning

it

Consigli per l'uso

sv

Bruksanvisning

ru

Инструкция по применению

el

Οδηγίες χρήσης

nl

Gebruiksaanwijzing

pl

Instrukcja obsługi

pt

Instruções de uso

es

SKŁAD
Etanol, silanowe środki sprzągające itp.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zźródłami zapłonu.

RO ASE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Primer pentru adeziunea porțelanului sau a materialului compozit

DESCRIEREA PRODUSULUI
SHOFU Porcelain Primer este un agent cu proprietăți de primer destinat tratării suprafețelor restaurărilor de porțelan sau material compozit pentru a spori adeziunea cimentului rășinic adeziv. SHOFU Porcelain Primer poate fi utilizat intraoral și extraoral.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Lipirea restaurărilor de porțelan sau material compozit cu ciment rășinic adeziv

PRECAUȚII SI AVERTIZĂRI

1. Nu utilizați acest produs la pacientii cu alergii cunoscute la acest material și/sau la monomerul de metacrilat.

2. Utilizatorii cu alergii cunoscute la acest material și/sau la monomerul de metacrilat să nu întrebuințeze acest produs.

3. Dacă pacientul și/sau utilizatorul prezintă orice semne de inflamație sau alte reacții alergice, întrerupeți imediat utilizarea produsului și solicitați asistență medicală.

4. Utilizați acest produs în zone bine aerisite, pentru a evita inhalarea etanolului (se recomandă către aerisirea corespunzătoare pe ora).

Dacă inhalarea produce greava sau o stare patologică, odihniți-vă și expuneți organismul la aer curat, păstrându-i căldura.

5. Evitați orice surse de aprindere, întrucât acest produs este inflamabil.

6. Utilizați mănuși și ochelari de protecție pentru a evita sensibilizarea la acest produs. În caz de contact accidental cu tesuturile orale moi sau cu pielea, stergeți imediat cu un tampon de vată imbibat în alcool și clătiți cu apă din abundență. În caz de contact cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și solicitați asistență medicală.

7. Respectați instrucțiunile de utilizare aferente fiecărui material, instrument sau echipament ce urmărează să fie folosită împreună cu acest produs.

8. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele menionate în mod specific în aceste instrucțiuni de utilizare.

9. Utilizați acest produs înainte de data de expirare indicată pe ambalaj sau pe container.
(Exemplu: AAAA-LL-ZZ → Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

10. Acest produs este destinat utilizării numai de către specialiști în domeniul stomatologiei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pretratarea suprafeței restaurării

1-1. Utilizarea intraorală
Aspirați suprafața de adeziune a restaurării utilizând un instrument dentar abraziv (de ex. o piatră diamantată etc.), clătiți cu apă și uscați cu aer curat. Tratamentul suplimentar de gravare cu acid fosforic gravant (concentrație de 30-40%) sporesc efectul adeziv.

1-2. Utilizarea extraorală
Sablăți suprafața de adeziune a restaurării cu ooxid de aluminiu de 50-100 µm, la aproximativ 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Apoi clătiți cu apă și uscați cu aer curat.

2. Aplicarea produsului SHOFU Porcelain Primer
Distribuția o cantitate adecvată de SHOFU Porcelain Primer într-un vas. Aplicați într-un singur strat, pe întregă suprafață adezivă, cu o pensulă de unică folosință. Lăsați pe suprafață timp de 10 sec. și uscați cu apă în mod natural.

3. Aplicarea/Repararea restaurării
Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului cimentului rășinic adeziv.

(Observații)

➤ Nu amestecați cu niciun alt primer sau sistem adeziv.

➤ Strângeți capacul sticlei după fiecare utilizare deoarece acest produs conține componente volatile. Utilizați prompt tot materialul distribuit.

➤ Utilizați ejector sau aspiratorul său de salivă în timpul procedurii.

➤ Evitați contaminarea suprafeței de adeziune a restaurării. Dacă suprafața este contaminată cu salivă sau sânge, curătați temeinic suprafața cu un tampon de vată înnăuat în alcool. Apoi uscați și aplicați materialul din nou.

➤ Utilizați tot materialul distribuit la numai un singur pacient.

➤ Nu utilizați din pensulele de unică folosință pentru a evita contaminarea încrucișată.

COMPOZIȚIE

Etanol, agent de cuplare pe bază de silan etc.

DEPOZITARE

A se depozita la temperatura camerei (1-30 °C). A se feri de lumina solară directă și de orice surse de aprindere.

SV LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

Primer för bonding av porslin eller komposit

PRODUKTBESKRIVNING

SHOFU Porcelain Primer är en vidhäftningspromotor som är avsedd för behandling av ytterpå ländersättningar av porslin eller komposit, för att öka bindningen till adhesivt resinsement. SHOFU Porcelain Primer kan användas intraoralt och extraoralt.

AVSEDD ANVÄNDNING

Bonding av ländersättningar av porslin eller komposit till adhesivt resinsement.

FÖRSIKTIGHETSGÅRDER OCH VARNINGAR

1. Denne produktet får ikke anvendes på patienter med kände allergier mot detta material eller mot metakrylatmonomer.
2. Användare med kända allergier mot det här materialet eller mot metakrylatmonomer får inte använda den här produkten.
3. Om någon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion uppträder hos patienten eller användaren: Avbryt användningen omedelbart och rådgör med läkare.
4. Använd produkten i välvinterlärade utrymmen för att undvika inändring av etanol. (Vi rekommenderar att uttrymmet ventileras flera gånger i tiden). Om inändring orsakar illamående eller sjukdom, ska den drabbade vila och hållas varm i frisk luft.
5. Undvik alla anländningskällor efterom produkten är lättändlandlig.
6. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att undvika sensibilisering mot produkten. I händelse av kontakt med oral mjukvävnad eller hud, badda omedelbart med en bomulspellet fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. I fall av kontakt med ögonen: Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och rådgör med läkare.
7. Följ bruksanvisningarna för alla material, instrument och utrustningar som används tillsammans med den här produkten.
8. Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användning som specificeras i den här bruksanvisningen.
9. Använd produkten för det utgångsdatum som är angivet på förpackningen eller behållaren.
(Ex. AAAA-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatumet)
10. Produkten är endast avsedd för yrkesmässig användning inom tandvården.

BRUKSANVISNING

1. Förbehandling av ländersättningens yta

1-1. Intraoral användning
Rugga upp fastytan på ländersättningens med en lämplig dental fräs (t.ex. diamantborr etc.), spola med vatten och torka med en tryckluft.

Tilläggstillbehandling med etsing med ett itsmedel som innehåller fosforsyra (koncentration ca 30-40%) ökar den vidhäftande effekten.

1-2. Extraoral användning
Sandblästra fastytan på ländersättningens med 50-100 µm aluminiumoxid vid ca 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Spola därefter med vatten och torka med en tryckluft.

2. Aplicering av SHOFU Porcelain Primer
Placerar en lämplig mangn SHOFU Porcelain Primer i en skål. Aplicera i ett skål på hela fastytan med hjälp av en engångspensel. Låt det verka omkring 10 sek och självtorka.

3. Placering/lagning av ländersättningens
Följ tillverkarens bruksanvisning för det adhesiva resinsementet.

(Obs!)
➤ Blanda aldig med andra primer- eller bondingsystem.

➤ Stäng flasklocket noga efter varje användning, eftersom produkten innehåller flyktiga komponenter. Använd hela det uttagna materialet omedelbart.

➤ Använd salivsgul eller op-sug under fortarandet.

➤ Undvik kontamination av den yta på ländersättningens som ska bondas. Om ytan är kontaminerad med saliv eller blod, rengör ytan nog med bomulspellet fuktad med alkohol. Torka sedan och applicera materialet på nytt.

➤ Använd hela det uttagna materialet enbart på en patient.

➤ För att undvika korskontaminering får aldig engångspenslar återanvändas.

SAMMANSÄTTNING
Etanol, silan-kopplingsmedel etc.

FÖRVARING

Förvaras vid rumstemperatur (1-30 °C). Får ej utsättas för direkt solinstrålning och ska förvaras åtskillt från antändningskällor.

el ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Τροποποιητής για συγκόλληση πορσελάνης ή σύνθετης ρητίνης

ΠΡΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

To SHOFU Porcelain Primer είναι ένας τροποποιητικός παραγόντας σχέδιασμένος για να προστατεύει τις επιφάνειες της πορσελάνης ή των αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης για να βελτιώσει το δεσμό με συγκόλλητική ρητίνη κοντά. Το SHOFU Porcelain Primer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοστοματικά και ξενιστοματικά.

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συγκόλληση πορσελάνης ή αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης με συγκόλλητη ρητίνη κοντά.

- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**
1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες σ' αυτό το υλικό και/ή μεθακρυλικό μονομερές.
2. Οι χειριστές με γνωστές αλλεργίες σ' αυτό το υλικό και/ή μεθακρυλικό μονομερές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
3. Εάν αποιδηπούστε φλεγμονή ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις εμφανισθούν σίτε στον ασθενή είτε στον χειριστή μεσά σταματήστε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβολή.
4. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλού αεριζόμενο περιοχές για την απορυγή εισιτήρης της αιθανόλης (συνιστώνται αρκετά έξαρσησι μάλιστας ώρα). Εάν η εισιτήρη προκαλέσει ναυτιά ή ασθένεια, ξέκουραστε και παραμείνετε ζεστοί στο καθάρο αέρα.
5. Αποφύγετε κάθε τηγή αναφλεξης καθώς το υλικό είναι εύφλεκτο.
6. Χρησιμοποιείτε γάντια και γυαλιά για την αποφυγή εισιτήρης στο αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με μαλακά μοριά της στοματικής κοιλότητας ή το δέρμα με αφρόνα νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά μέσα στην επαφήνετε με νερό νερό και ζητήστε ιατρική συμβολή.
7. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης καθώς υπάρχει σύμβαση.
8. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτές που είδικά περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
9. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στο πακέτο ή το μπουλότα.
(Παράδειγμα: EEEEEE-MM-HH → Ετος-Μήνας-Ημέρα που ημερομηνίας λήξης)
10. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από οδοντιάτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία της επιφάνειας της αποκατάστασης
 - 1-1. Ενδοστοματική χρήση
Εκτραχύνετε την επιφάνεια συγκόλλησης της αποκατάστασης χρησιμοποιώντας ένα δοντιανότικο εκτριπτικό (πγ. εγγυλιθίδα διαμαντίου λκτ.). ζεστήνετε με νερό και στεγνώστε με καθάρο αέρα.
1-2. Εξωστοματική χρήση
Αμυνοβολείτε την επιφάνεια συγκόλλησης της αποκατάστασης με οξείδιο του αλουμινίου 50-100 μμ με περίορισμα 0,1-0,2 MPa/1-2 bar. Στη συνέχεια ζεστήνετε με νερό και στεγνώστε με καθάρο αέρα.
 2. Εφαρμογή του SHOFU Porcelain Primer
Διεύθεστε επικράτη την επιφάνεια συγκόλλησης σε ένα στρώμα με το αναλώσιμο τυχαίο. Αφήστε αδιατάραπτο για 10 sec. και να στεγνώσει φυσικά.
 3. Τοποθέτηση/Επιδόρμωση των αποκαταστάσεων
Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης της κατασκευαστή της συγκόλλητικής ρητίνης.
- (Σημειώσεις)
 - Μη το συμιγνύετε με άλλους τροποποιητές ή συγκόλλητικές συστήματα.
 - Κλείστε ερμηνικά το καπάκι μετά από κάθε χρήση καθώς το προϊόν περιέχει πιπικά συστατικά. Χρησιμοποιήστε σωστά το διατηρένο υλικό.
 - Χρησιμοποιήστε σιελάνια ή ιαγώνια αναρρόφησης κατά τη διαδικασία.
 - Αποφύγετε επιμόλυνση της αποκαταστατικής επιφάνειας προς συγκόλληση. Εάν η επιφάνεια επιρρούνται με σάλια ή αίρα, καθρέψτε επιμελώς την επιφάνεια με σαφαρίδιο βάθμιας εμποτισμένο σε αλοκόλη. Στη συνέχεια στεγνώστε και εφαρμόστε για το υλικό που διατηρείται στο δισκάκι σε έναν μόνο ασθενή.
 - Χρησιμοποιήστε αλλιώς όταν το υλικό που διατηρείται στο δισκάκι σε έναν μόνο ασθενή.
 - Μην επαναχρησιμοποιείτε τα αναλώσιμα πινελέκια για να αποφύγετε τη δισταραρούμενη μόλυνση.

ΣΥΝΟΨΗ

Αισιονόλη, συζευκτικός παράγοντας στιλανίου κλπ

ΦΥΛΑΞΗ

Να φυλασσεται σε θερμοκρασία δωματίου (1-30 °C). Κρατήστε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και κάθε πηγή ανάφλεξης

- pt LER COM ATENÇÃO ANTES DE USAR**
- #### Primer para colar porcelana ou compósito
- ##### DESCRICAÇÃO DO PRODUTO
- SHOFU Porcelain Primer é um agente de preparação previsto para tratar as superfícies de restaurações de porcelana ou compósito, a fim de melhorar a aderência com cimento de resina adesiva. O SHOFU Porcelain Primer pode ser usado intraoral e extraoralmente.
- ##### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Colagem de restaurações de porcelana ou compósito com cimento de resina adesiva.
- ##### PREENCUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
1. Não usar este produto em pacientes com alergias conhecidas a este material e/ou a um monômero de metacrilato.
2. Os operadores com alergias conhecidas a este material e/ou a um monômero de metacrilato não devem usar este produto.
3. Se ocorrer qualquer inflamação ou outras reações alérgicas no paciente ou no operador, interromper imediatamente a utilização e procurar assistência médica.
4. Usar em áreas bem ventiladas para evitar a inalação de etanol (são recomendadas várias ventilações adequadas por hora). Se a inalação provocar náusea ou mal-estar, descansar e manter-se aquecido em local com ar fresco.
5. Evitar qualquer fonte de ignição, uma vez que este produto é inflamável.
- <div data-bbox="252